

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ tên thí sinh:.....SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.


Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x-3)^2 e^x$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng

- A. 9. B. e^2 . C. 0. D. $4e$.

Câu 2. Bất phương trình $1 + \log_2(x-2) > \log_2(x^2 - 3x + 2)$ có tập nghiệm là

- A. $S = (2; 3)$. B. $S = (3; +\infty)$. C. $S = (2; +\infty)$. D. $S = (1; 3)$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.

Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-2; +\infty)$. B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{1}{2}; 0\right)$.
 C. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -2\right)$. D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -3)$.


Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$	
y	$+\infty$	$\searrow$	5	$\nearrow$	0	$\searrow$	$-\infty$

Giá trị cực đại của hàm số $y = f(x)$ là:

- A. 1. B. -3 . C. 5. D. 0.

Câu 5. Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số nào dưới đây?



- A. $y = x^3 + x^2 - 1$. B. $y = x^3 - 3x + 1$. C. $y = -x^2 + x - 1$. D. $y = -x^3 + 3x - 1$.

Câu 6. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a . Tính góc tạo bởi $B'C$ và mặt phẳng $(ABB'A')$ biết $BB' = \frac{a\sqrt{2}}{2}$.

- A. 45° . B. 60° . C. 90° . D. 30° .

Câu 7. Nghiệm của phương trình $\cos x = \frac{1}{2}$ là

- A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.
C. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 8. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. B. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.
C. $\overrightarrow{AO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$. D. $\overrightarrow{AO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'})$.

Câu 9. Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x-1}$ có phương trình là

- A. $x = 1$. B. $y = 2$. C. $x = 2$. D. $y = 4$.

Câu 10. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(100;50;5)$ đến điểm $B(200;100;10)$ trong 10 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 10 phút tiếp theo là điểm nào?

- A. $M(100;50;5)$. B. $N(200;150;-15)$. C. $D(-300;150;15)$. D. $C(300;150;15)$.

Câu 11. Quỹ đạo của sao hỏa là elip có bán trục lớn 227,9 triệu km, bán trục nhỏ bằng 226,9 triệu km và quay quanh mặt trời một vòng hết 687 ngày. Khoảng cách xa nhất giữa sao hỏa và mặt trời gần số nào sau đây nhất?

- A. 21,32604. B. 226,9. C. 206,57396. D. 249,22604.

Câu 12. Trong không gian $Oxyz$, cho biểu diễn của vectơ $\vec{a}$ qua các vectơ đơn vị là $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{k} - 3\vec{j}$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}$ là

- A. $(2;1;-3)$. B. $(1;-3;2)$. C. $(2;-3;1)$. D. $(1;2;-3)$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nhà ông A cần làm một bể chứa nước có dạng khối hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình chữ nhật và chiều dài gấp ba lần chiều rộng, khối hộp tương ứng có thể tích bằng 1152dm^3 . Giả sử bể dày của thành bể và đáy bể là không đáng kể. Giá thuê công nhân để làm bể là 400000 đồng/ m^2 . Gọi x là chiều rộng của đáy bể (x là số dương và có đơn vị là dm). Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Chi phí thấp nhất mà ông A trả cho công nhân làm bể nước theo yêu cầu là 3072000 đồng.

b) Chiều cao của bể nước là $\frac{384}{x^2}$ (dm).

c) Diện tích xung quanh của bể chứa nước là $\frac{3072}{x}$ (dm²).

d) Tổng diện tích cần làm của bể chứa nước là $\frac{3072}{x} + 6x^2$ (dm²).

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;1;2)$, $B(5;1;-2)$ và $C(3;5;0)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?


a) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

b) Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{BC}$ là $(-2;4;2)$.

c) Điểm $G\left(\frac{7}{3}; \frac{9}{3}; 0\right)$ là trọng tâm của tam giác ABC .

d) Điểm $H(a;b;c)$ là chân đường cao hạ từ A xuống cạnh BC . Khi đó $a+b-c=8$.

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây.



Biết đường tiệm cận của đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(0;1)$ và $(1;0)$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-4;0)$.

b) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

c) Ta có $a + b + c + d = -2$.

d) Tiếp tuyến tại điểm M thuộc đồ thị hàm số cắt hai đường tiệm cận lần lượt tại A và B . Khi đó $MA \cdot MB$ đạt giá trị nhỏ nhất là $8\sqrt{2} - 8$.

Câu 4. Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 5 bi trắng, 6 bi đỏ và 7 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp; trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) Xác suất chọn được 6 viên bi đủ ba màu, đồng thời ba số $x - y, y - z, z - x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng là $\frac{40}{221}$.

b) Xác suất chọn được ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,95.

c) Xác suất chọn được 6 viên bi toàn màu xanh là $\frac{1}{2652}$.

d) Xác suất chọn được ít nhất 5 viên bi màu xanh là $\frac{1}{78}$.


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong một phòng thí nghiệm, số lượng của một vi khuẩn X được biểu diễn theo công thức $S(t) = A.e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 150 con. Sau 3 giờ số lượng vi khuẩn X là 450 con. Cùng

thời điểm 0 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 5% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).


Câu 2. Gia đình ông Thanh nuôi tôm với diện tích ao nuôi là $100m^2$. Vụ tôm vừa qua ông nuôi với mật độ là $1(kg/m^2)$ tôm giống và sản lượng tôm khi thu hoạch được 2 tấn tôm. Với kinh nghiệm nuôi tôm nhiều năm, ông cho biết cứ thả giảm đi $(200g/m^2)$ tôm giống thì sản lượng tôm thu hoạch được 2,4 tấn tôm. Vậy vụ tới ông phải thả bao nhiêu kg tôm giống để đạt sản lượng tôm cho thu hoạch là lớn nhất? (Giả sử không có dịch bệnh, hao hụt khi nuôi tôm giống).

Câu 3. Một chiếc máy bay đang bay trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất như hình vẽ.




Biết rằng khi đang ở độ cao 8000 mét so với mặt đất (vị trí A) thì máy bay chuyển động đều với vận tốc $\vec{v}(100; 110; 200)$ (đơn vị m/s). Hỏi sau 30 giây thì máy bay đã lên đến độ cao bao nhiêu km so với mặt đất?

Câu 4. Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 306 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tỷ đồng?



Câu 5. Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều cạnh $4\sqrt{3}dm$, bạn An cắt bỏ sáu tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp lục giác đều (Hình vẽ). Thể tích của khối

chóp có giá trị lớn nhất bằng $\frac{a\sqrt{b}}{c}dm^3$, với $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản và $b < 20$. Tính $a + 2b + 3c$.



Câu 6. Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là $s = -t^3 + 6t^2 + 17t$, với $t(s)$ là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $s(m)$ là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 8 giây đầu tiên, vận tốc $v(m/s)$ của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu m/s ?


----- HẾT -----

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ tên thí sinh:.....SBD:.....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12.

Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào?

- A. $y = x^3 - 6x + 2$. B. $y = -x^3 + 3x^2 + 2$. C. $y = x^3 - 3x + 2$. D. $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O là tâm của hình lập phương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A. $\overrightarrow{BO} = \frac{1}{2}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'})$. B. $\overrightarrow{BO} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'})$.
 C. $\overrightarrow{BO} = \frac{2}{3}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'})$. D. $\overrightarrow{BO} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB'})$.

Câu 3. Nghiệm của phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ là

- A. $x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. B. $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.
 C. $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi, x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$. D. $x = \frac{\pi}{3} + k\pi, x = \frac{-\pi}{3} + k\pi (k \in \mathbb{Z})$.

Câu 4. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-4}{x-1}$ có phương trình là

- A. $y = 2$. B. $x = 2$. C. $x = 1$. D. $y = 4$.

Câu 5. Quỹ đạo của sao hỏa là elip có bán trục lớn 227,9 triệu km, bán trục nhỏ bằng 226,9 triệu km và quay quanh mặt trời một vòng hết 687 ngày. Khoảng cách gần nhất giữa sao hỏa và mặt trời gần số nào sau đây nhất?

- A. 249,22604. B. 226,9. C. 21,32604. D. 206,57396.

Câu 6. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-3	-2	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		5		0	$-\infty$


Giá trị cực tiểu của hàm số $y = f(x)$ là:

- A. 1. B. 5. C. 0. D. -3.

Câu 7. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = (x-2)^2 e^x$ trên đoạn $[-1;1]$ bằng

- A. 4. B. e . C. $9e^{-1}$. D. 0.

Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định, có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới.



Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{9}{2}; -\frac{5}{2}\right)$. B. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
C. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; -2)$. D. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{5}{2}; -1\right)$.

Câu 9. Trong không gian chọn hệ trục tọa độ cho trước, đơn vị đo lấy kilômét, ra đã phát hiện một máy bay di chuyển với vận tốc và hướng không đổi từ điểm $A(200;70;8)$ đến điểm $B(400;100;10)$ trong 8 phút. Nếu máy bay tiếp tục giữ nguyên vận tốc và hướng bay thì tọa độ của máy bay sau 8 phút tiếp theo là điểm nào?

- A. $C(600;130;12)$. B. $D(0;40;6)$. C. $N(400;170;-18)$. D. $M(200;70;8)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, cho biểu diễn của vector $\vec{a}$ qua các vector đơn vị là $\vec{a} = 2\vec{k} + \vec{i} - 3\vec{j}$. Tọa độ của vector $\vec{a}$ là

- A. $(2; -3; 1)$. B. $(2; 1; -3)$. C. $(1; 2; -3)$. D. $(1; -3; 2)$.

Câu 11. Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông cân tại C , cạnh $BC = 2a = BB'$. Tính góc tạo bởi $B'C$ và mặt phẳng $(ABB'A')$.

- A. 45° . B. 30° . C. 90° . D. 60° .

Câu 12. Bất phương trình $1 + \log_3(x^2 + x - 2) < \log_3(-7x - 9)$ có tập nghiệm là

- A. $S = (-3; -2)$. B. $S = \left(-3; -\frac{1}{3}\right)$. C. $S = \left(-3; -\frac{9}{7}\right)$. D. $S = (-\infty; -3)$.


PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một hộp chứa các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau gồm 6 bi trắng, 7 bi đỏ và 4 bi xanh. Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi từ hộp; trong đó có x viên bi trắng, y viên bi đỏ và z viên bi xanh. Các khẳng định sau đúng hay sai?

- a) Xác suất chọn được ít nhất 5 viên bi màu trắng là $\frac{1}{78}$.
b) Xác suất chọn được 6 viên bi đủ ba màu, đồng thời ba số $y-z, x-y, z-x$ theo thứ tự lập thành cấp số cộng là $\frac{69}{442}$.
c) Xác suất chọn được 6 viên bi toàn màu đỏ là $\frac{1}{1786}$.
d) Xác suất chọn được ít nhất một viên bi màu xanh nhỏ hơn 0,95.

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x + d}$ có đồ thị là đường cong như hình vẽ dưới đây, biết đường tiệm cận của

đồ thị hàm số đi qua hai điểm $(0;0)$ và $(1;-1)$.



a) Tập xác định của hàm số là $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

b) Ta có $2a + b + c + d = -3$.

c) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2;0)$.

d) Tiếp tuyến tại điểm M thuộc đồ thị hàm số cắt hai đường tiệm cận tại A và B . Khi đó $MA \cdot MB$ đạt giá trị nhỏ nhất là $3\sqrt{2} - 2$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;3;2)$, $B(5;1;4)$ và $C(3;4;3)$.

a) Tọa độ của vector $\overrightarrow{AB}$ là $(-4;2;-2)$.

b) $\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{AB} = -8$.

c) Điểm $H(a;b;c)$ là chân đường cao hạ từ C xuống cạnh AB . Khi đó $3a - b - c = 2$.

d) Điểm $G\left(3;\frac{8}{3};3\right)$ là trọng tâm của tam giác ABC .

Câu 4. Nhà ông A cần làm một bể chứa nước có dạng khối hộp chữ nhật không nắp, có đáy là hình chữ nhật và chiều dài gấp hai lần chiều rộng, khối hộp tương ứng có thể tích bằng 972 dm^3 . Giả sử bể dày của thành bể và đáy bể là không đáng kể. Giá thuê công nhân để làm bể là 500000 đồng/ m^2 . Gọi x là chiều rộng của đáy bể (x là số dương và có đơn vị là dm).

a) Diện tích xung quanh của bể chứa nước là $\frac{2916}{x} (\text{dm}^2)$.


b) Chiều cao của bể nước là $\frac{468}{x^2} (\text{dm})$.

c) Tổng diện tích cần làm của bể chứa nước là $\frac{2916}{x} + 2x^2 (\text{dm}^2)$.

d) Chi phí thấp nhất mà ông A trả cho công nhân làm bể nước theo yêu cầu là 2430000 đồng.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một chiếc máy bay đang bay trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất như hình vẽ.




Biết rằng khi đang ở độ cao 6000 mét so với mặt đất (vị trí A) thì máy bay chuyển động đều với vận tốc $\vec{v}(90; 120; 150)$ (đơn vị m/s). Hỏi sau 20 giây thì máy bay đã lên đến độ cao bao nhiêu km so với mặt đất?

Câu 2. Một chất điểm chuyển động có phương trình chuyển động là $s = -t^3 + 3t^2 + 25t$, với $t(s)$ là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động và $s(m)$ là quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó. Trong khoảng thời gian 10 giây đầu tiên, vận tốc $v(m/s)$ của chất điểm đạt giá trị lớn nhất bằng bao nhiêu m/s ?

Câu 3. Từ một tấm bìa mỏng hình lục giác đều cạnh $6\sqrt{3} dm$, bạn Phương cắt bỏ sáu tam giác cân bằng nhau có cạnh đáy là cạnh của hình lục giác đều ban đầu và đỉnh là đỉnh của một hình lục giác đều nhỏ phía trong rồi gấp lên, ghép lại tạo thành một khối chóp lục giác đều (Hình vẽ). Thể tích của khối chóp có giá trị lớn nhất bằng


$\frac{a\sqrt{b}}{c} dm^3$, với $\frac{a}{c}$ là phân số tối giản và $b < 20$. Tính $a - 10b - 5c$.



Câu 4. Gia đình ông Thanh nuôi tôm với diện tích ao nuôi là $200 m^2$. Vụ tôm vừa qua ông nuôi với mật độ là $1(kg/m^2)$ tôm giống và sản lượng tôm khi thu hoạch được 3,6 tấn tôm. Với kinh nghiệm nuôi tôm nhiều năm, ông cho biết cứ thả giảm đi $(200 g/m^2)$ tôm giống thì sản lượng tôm thu hoạch được 4 tấn tôm. Vậy vụ tới ông phải thả bao nhiêu kg tôm giống để đạt sản lượng tôm cho thu hoạch là lớn nhất (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)? (Giả sử không có dịch bệnh, hao hụt khi nuôi tôm giống).

Câu 5. Trong một phòng thí nghiệm, số lượng của một vi khuẩn X được biểu diễn theo công thức $S(t) = A.e^{rt}$, trong đó A là số lượng vi khuẩn tại thời điểm chọn mốc thời gian, r là tỉ lệ tăng trưởng ($r > 0$), t là thời gian tăng trưởng (tính theo đơn vị là giờ). Lúc 0 giờ sáng, số lượng vi khuẩn X là 250 con. Sau 3 giờ số lượng vi khuẩn X là 500 con. Cùng thời điểm 0 giờ, người ta đo được số lượng vi khuẩn Y là 300 con. Biết rằng số lượng vi khuẩn Y tăng 8% mỗi giờ. Hỏi vào lúc mấy giờ, số lượng vi khuẩn X bằng số lượng vi khuẩn Y. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Một kiến trúc sư muốn xây dựng 1 tòa nhà biểu tượng độc lạ cho thành phố. Trên bản thiết kế tòa nhà có hình dạng là một khối lăng trụ tam giác đều, có cạnh bên bằng cạnh đáy và dài 280 mét (tham khảo hình vẽ). Kiến trúc sư muốn xây dựng một cây cầu MN bắc xuyên tòa nhà (điểm đầu thuộc cạnh $A'C'$, điểm cuối thuộc cạnh BC') và cây cầu này sẽ được dát vàng với đơn giá 5 tỷ đồng trên 1 mét dài. Vì vậy để đáp ứng bài toán kinh tế, kiến trúc sư phải chọn vị trí cây cầu sao cho MN ngắn nhất. Khi đó giá xây cây cầu này hết bao nhiêu tỷ đồng?



----- HẾT -----

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN

Phần	I	II	III									
Câu\Mã Đề	0101	0102	0103	0104	0105	0106	0107	0108	0109	0110	0111	0112
1	B	D	C	B	A	D	C	D	B	B	A	A
2	A	A	D	B	D	B	D	D	B	C	C	C
3	A	C	D	A	C	C	D	A	D	A	B	D
4	D	C	C	C	A	A	B	C	A	C	B	A
5	D	D	C	B	A	D	B	B	A	B	C	A
6	A	B	D	A	D	B	C	B	D	B	C	D
7	C	B	A	C	C	D	A	C	C	A	A	B
8	B	C	B	D	B	C	C	C	B	D	D	C
9	B	A	B	D	D	A	B	B	A	D	A	D
10	D	D	A	A	B	C	D	A	C	A	B	C
11	D	B	A	D	B	A	A	D	D	C	D	B
12	C	A	B	C	C	B	A	A	C	D	D	B
1	SĐĐS	SĐSĐ	SĐĐĐ	ĐSSĐ	SĐSĐ	ĐSSĐ	ĐĐSS	SĐĐĐ	SĐĐĐ	ĐĐSĐ	ĐSSĐ	SĐĐS
2	SĐSĐ	ĐĐĐS	ĐSSĐ	ĐĐSĐ	ĐSĐĐ	SĐĐĐ	ĐĐĐS	ĐĐSĐ	SSĐĐ	ĐĐSS	ĐĐĐS	SĐĐĐ
3	SSĐĐ	SĐĐĐ	SĐSĐ	ĐĐSĐ	ĐĐSS	ĐĐĐS	ĐSSĐ	ĐĐSS	SĐSĐ	SĐĐĐ	SSĐĐ	ĐĐĐS
4	ĐSĐĐ	ĐSĐĐ	SSĐĐ	ĐĐĐS	ĐSSĐ	ĐSĐĐ	SĐSĐ	ĐĐĐS	ĐSSĐ	ĐĐSĐ	ĐSĐS	SĐĐĐ
1	2,18	9	14	4509	684	626	70	1,18	14	151	684	28
2	70	28	2,18	1,18	14	9	684	4509	684	1,18	1921	151
3	14	4509	70	28	1921	151	14	28	29	4509	14	626
4	684	151	29	151	2,18	28	2,18	151	1921	28	2,18	9
5	1921	1,18	1921	9	70	1,18	1921	626	2,18	9	70	4509
6	29	626	684	626	29	4509	29	9	70	626	29	1,18