

- Họ và tên thí sinh: Lớp

– Số báo danh :

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh làm từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Loài, nhóm loài thực vật nào sau đây chỉ có chu trình Calvin trong pha tối quang hợp?


A. Xương rồng.

B. Rau dền.

C. Đậu

D. Ngô.

Câu 2. Hình ảnh sau mô tả các bước thí nghiệm chứng minh sự hình thành tinh bột trong quang hợp ở thực vật. Dựa vào hình ảnh, hãy cho biết có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?



I. Phần lá bị bịt giấy đen sau khi nhúng vào dung dịch iodine thì không quan sát thấy sự đổi màu.

II. Phần lá bị bịt giấy đen sau khi nhúng vào dung dịch iodine có sự đổi màu xanh tím.

III. Đun sôi cách thủy trong cồn nhằm mục đích loại bỏ diệp lục trong lá để quan sát thí nghiệm dễ dàng hơn.

IV. Phần lá không bị bịt giấy đen sau khi nhúng vào dung dịch iodine có sự đổi màu xanh tím.

V. Mục đích của việc đặt chậu cây trong bóng tối 2 ngày nhằm mục đích thúc đẩy quá trình hô hấp ở thực vật.


A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 3: Hình 1 mô tả hệ thống tuần hoàn máu ở cơ thể người. Chú thích 1, 2, 3, 4 trong hình 1 là hệ thống các mạch máu.



Hình 1

Quan sát hình trên và cho biết phát biểu nào dưới đây **không đúng**?


A. 2 và 4 là những mạch máu giàu O_2 .

B. 1 và 2 là những mạch máu giàu CO₂.

C. Tất cả các mạch máu 1,2,3,4 đều được cấu tạo từ ba lớp.

D. Trong mạch máu số 4, máu chảy dưới áp lực cao.

Câu 4. Để tạo giống lúa vàng (*Golden rice*) giàu Beta-caroten góp phần cải thiện tình trạng thiếu vitamin A ở trẻ em, người ta cần chuyển gene X từ một loài thực vật vào cây lúa. Quy trình này sử dụng vi khuẩn *Agrobacterium tumefaciens* làm tế bào nhận để chuyển gene. Một trong những công đoạn rất quan trọng của quy trình này được biểu diễn trong hình dưới đây.



Phát biểu nào sau đây là đúng về hình này?

A. Cấu trúc 1 là DNA tái tổ hợp.

B. Cấu trúc 2 là thể truyền.

C. 4 có thể là DNA vùng nhân của vi khuẩn.

D. T là giai đoạn cần sử dụng enzyme restrictase.

Câu 5. Ở đậu Hà Lan, allele quy định kiểu hình hạt trơn và allele quy định kiểu hình nào sau đây được gọi là một cặp allele?

A. Hạt nhăn.

B. Thân cao.

C. Hạt vàng.

D. Hoa trắng.

Câu 6. Trong công nghệ DNA tái tổ hợp, enzyme cắt giới hạn Restrictase được dùng để


A. nối gene cần chuyển vào vector tạo DNA tái tổ hợp.

B. nhận biết dòng tế bào nhận mang DNA tái tổ hợp.

C. làm giãn màng sinh chất của tế bào nhận.

D. tạo đầu nối giữa vector và gene cần chuyển.

Câu 7: Sơ đồ dưới đây mô tả quá trình tái bản DNA, hãy quan sát hình và cho biết



Enzyme Helicase trong quá trình tái bản DNA có vai trò?

A. Xúc tác tổng hợp nên đoạn mồi cung cấp đầu 3'-OH cho enzyme DNA polymerase tổng hợp mạch mới.

B. Loại bỏ đoạn mồi và tổng hợp đoạn DNA thay thế.

C. Xúc tác nối các phân đoạn Okazaki lại với nhau hình thành mạch ra chậm.

D. Tháo xoắn DNA thành 2 mạch đơn.

Câu 8: Ở một loài thực vật, do đột biến điểm xảy ra ở vùng mã hoá của gene, từ gene B đã làm xuất hiện 4 allele mới. Bảng dưới đây thể hiện tổng số các cặp nucleotide từng loại, số liên kết hydrogen trong các allele và số amino acid trong chuỗi polypeptide tương ứng ở trong tế bào. Dấu (-) thể hiện số liệu chưa xác định.

	Allele B	Allele B ₁	Allele B ₂	Allele B ₃	Allele B ₄
Số cặp nucleotide A - T	676	-	676	675	-
Số cặp nucleotide G - C	492	492	-	493	492
Số liên kết hydrogen	-	2828	2831	-	2830
Số amino acid	252	241	255	252	231

Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây **không** đúng?

- A.** Allele B₁ có thể phát sinh đột biến mất 1 cặp nucleotide làm dịch khung đọc và xuất hiện sớm mã kết thúc, từ đó làm giảm số amino acid trong chuỗi polypeptide so với allele B.
- B.** Allele B₂ có thể phát sinh đột biến thay thế 1 cặp G – C bằng 1 cặp A – T mà không làm thay đổi số amino acid trong chuỗi polypeptide tương ứng.
- C.** Allele B₃ có thể phát sinh đột biến thay thế 1 cặp G – C bằng 1 cặp A – T làm giảm số liên kết hydrogen nhưng không làm thay đổi số amino acid.
- D.** Allele B₄ có thể phát sinh đột biến làm xuất hiện bộ ba kết thúc sớm, dẫn đến chuỗi polypeptide ngắn hơn allele B.

Câu 9: Cho biết các codon mã hóa các amino acid tương ứng như sau:

GGG – Gly; CCC – Pro; GCU – Ala; CGA – Arg; UCG – Ser; AGC – Ser; UAC – Tyr.

Một đoạn mạch gốc của một gene ở vi khuẩn mang thông tin mã hóa cho đoạn polypeptide có 5 amino acid có trình tự các nucleotide là 3'CCC-AGC-ATG-CGA-GGG5'. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng?

- (1) Trình tự của 5 amino acid do đoạn gene này quy định tổng hợp là Gly - Ser - Tyr - Ala - Pro.
- (2) Nếu cặp A–T ở vị trí thứ 8 bị thay thế bằng cặp G–C thì không làm thay đổi số amino acid trong chuỗi polypeptide được tổng hợp.
- (3) Nếu xảy ra đột biến thay thế 1 cặp nucleotide ở bất kì vị trí nào trong đoạn gene thì trình tự amino acid của đoạn polypeptide luôn bị thay đổi.
- (4) Nếu đột biến mất cặp G-C ở vị trí thứ nhất thì trình tự và thành phần tất cả các amino acid trong đoạn polypeptide sẽ bị thay đổi.

- A. 1** **B. 2** **C. 3** **D. 4**

Câu 10. Một loài thực vật có 7 nhóm gene liên kết. Khi khảo sát một quần thể của loài này người ta thấy có 5 thể đột biến (kí hiệu A, B, C, D, E) có số lượng NST như sau:

Thể đột biến	A	B	C	D	E
Số lượng NST	21	13	15	28	35

Có bao nhiêu thể đột biến trên có thể thuộc thể đa bội lẻ?

- A. 4.** **B. 3.** **C. 1.** **D. 2.**

Câu 11: Giả sử ở một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể $2n = 6$, các cặp nhiễm sắc thể tương đồng được kí hiệu là Aa, Bb và Dd. Trong các dạng đột biến lệch bội sau đây, dạng nào là thể ba?

- A. AaaBbDd** **B. AaBbd.** **C. AaBbbDdd.** **D. AaBb.**

Câu 12. Nhóm, loài động vật nào sau đây có giới đực là giới dị giao tử?

- A. Châu chấu.** **B. Ong.** **C. Mèo.** **D. Chim.**

Câu 13: Bệnh Tay–Sachs là một rối loạn di truyền phá hủy các tế bào thần kinh trong não và tủy sống ở trẻ nhỏ, có thể gây tử vong. Một cặp vợ chồng đều có tiền sử mắc bệnh Tay–Sachs trong gia đình đang hi vọng thụ thai một đứa con nhưng lo ngại rằng họ có thể truyền lại chứng rối loạn này cho con. Để phòng sinh con không bị mắc bệnh, phương pháp đầu tiên cặp vợ chồng này cần sử dụng là:

- A.** xét nghiệm hai vợ chồng có mang gene bệnh hay không.
- B.** xét nghiệm phôi có mang gene bệnh hay không.
- C.** chọc dò dịch ối xem phôi có mang gene bệnh hay không.
- D.** sinh thiết tua nhau thai xem thai có mang gene bệnh hay không.

Câu 14: Trong cơ thể người, xét một gene (I) có 2 allele (B, b) đều có chiều dài 0,408 μm . gene B có chứa hiệu số giữa nucleotide loại T với một loại nucleotide khác là 20%, gene b có 3200 liên kết hydrogene. Phân tích hàm lượng nucleotide thuộc gene trên (gene I) trong một tế bào, người ta thấy có 2320 nucleotide loại C.

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

- (1) Tế bào đang xét có kiểu gene BBbb.
- (2) Có thể tế bào này đang ở kỳ đầu của quá trình nguyên phân.
- (3) Tế bào trên có thể là tế bào lưỡng bội bình thường hoặc là thể đột biến.
- (4) Tế bào này có thể đang ở kỳ đầu của quá trình giảm phân I

A. 4.


B. 3.

C. 1.

D. 2

Câu 15: Khi nghiên cứu sự di truyền về màu sắc lông trên chuột nhảy *Meriones unguiculatus*, màu sắc của lông do hai cặp gene không allele thuộc hai NST khác nhau quy định. Những con chuột có cả gene trội B và C sẽ có màu lông đen, những con chuột chỉ có gene trội C sẽ có màu lông nâu, các kiểu gene còn lại cho màu lông trắng. Quan sát sơ đồ lai dưới đây và cho biết, đâu là phát biểu đúng về sự di truyền màu sắc lông này?


- A. Số kiểu gene của chuột lông trắng nhiều hơn số kiểu gene của chuột lông nâu và lông đen.
- B. Khi lai chuột lông nâu với trắng, đời con thu được 100% chuột lông trắng.
- C. Cho chuột có kiểu gene dị hợp 2 cặp gene giao phối với nhau có thể thu được tỉ lệ kiểu hình là 12:3:1.
- D. Cho chuột có lông trắng giao phối với chuột có lông nâu có thể thu được chuột có lông màu đen.



Câu 16:

Hình vẽ sau đây mô tả một tế bào đang phân bào. Các chữ cái kí hiệu các gene tương ứng trên NST. Biết rằng đột biến xảy ra không quá một cặp NST. Dựa vào những thông tin trên hãy cho biết nhận định nào dưới đây là **sai**?

- A. Tế bào trên đang ở kỳ giữa của nguyên phân.
- B. Tế bào sinh dưỡng của loài trên có 3 cặp NST tương đồng.
- C. Một tế bào sinh dưỡng của loài trên có bộ NST là $2n = 6$.
- D. Kết thúc quá trình phân bào này, tạo ra loại giao tử thừa một NST.



Câu 17: Có bao nhiêu hiện tượng sau đây là ví dụ về thường biến (mềm dẻo kiểu hình)?

- I. Loài cáo Bắc cực (*Alopex lagopus*) sống ở xứ lạnh vào mùa đông có lông màu trắng, còn mùa hè thì có lông màu vàng hoặc xám.
- II. Lá của cây vạn niên thanh (*Dieffenbachia maculata*) thường có rất nhiều đốm hoặc vệt màu trắng xuất hiện trên mặt lá xanh.
- III. Màu hoa cẩm tú cầu (*Hydrangea macrophylla*) thay đổi phụ thuộc vào độ pH của đất: nếu $\text{pH} < 7$ thì hoa có màu lam, nếu $\text{pH} = 7$ hoa có màu trắng sữa, còn nếu $\text{pH} > 7$ thì hoa có màu hồng hoặc màu tím.

D. 3.

Giống lúa	Số 1	Số 2	Số 3	Số 4
Khối lượng tối đa	400	410	420	350
Khối lượng tối thiểu	300	270	250	310

D. Giống số 2

Chỉ tiêu	Bình thường	Khi thận suy giảm
Urê trong máu (mg/100 ml)	20	80
Ion Na ⁺ (mmol/L)	140	155
Lượng nước tiểu (ml/ngày)	1500	600

Kiểu gene	C ⁺ A ⁺	C ⁻ A ⁻	C ⁻ A ⁺ / C ⁺ A ⁻	C ^c A ⁻ / C ⁻ A ⁺
Hàm lượng enzyme A khi không có X	0	0	0	100pg
Hàm lượng enzyme A khi có X	100pg	0	100pg	100pg

Câu 3: Ở một loài thú, màu lông được quy định bởi một gene nằm trên nhiễm sắc thể thường có 4 allele: allele C^b quy định lông đen, allele C^y quy định lông vàng, allele C^g quy định lông xám và allele C^w quy định lông trắng. Trong đó allele C^b trội hoàn toàn so với các allele C^y , C^g và C^w ; allele C^y trội hoàn toàn

so với allele C^g và C^w ; allele C^g trội hoàn toàn so với allele C^w . Tiến hành các phép lai để tạo ra đời con. Cho biết không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?


- Kiểu hình lông vàng có nhiều kiểu gene quy định nhất.
- Phép lai giữa hai cá thể có kiểu hình khác nhau luôn tạo ra đời con có nhiều loại kiểu gene và nhiều loại kiểu hình hơn phép lai giữa hai cá thể có cùng kiểu hình.
- Phép lai giữa cá thể lông đen với cá thể lông vàng hoặc phép lai giữa cá thể lông vàng với cá thể lông xám có thể tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu gene và 3 loại kiểu hình.
- Có 3 phép lai (không tính phép lai thuận nghịch) giữa hai cá thể lông đen cho đời con có kiểu gene phân li theo tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

Câu 4: Edward Bernardi, đến từ Springwell (Anh) đã mất đi liên tiếp 6 đứa con khi mới chào đời hoặc được 1 đến 2 năm. Đứa con cuối cùng của bà sống sót được đến 21 tuổi. Bà rất buồn vì điều đó, bà không hiểu sao con bà lại lần lượt mất sớm như vậy. Nhóm nghiên cứu của giáo sư Doug Turnbull làm việc tại trường Đại học Newcastle (Anh) đã lao vào nghiên cứu trường hợp đặc biệt này và họ đã làm nên lịch sử khi phát hiện ra nguyên nhân gây ra những cái chết liên tiếp của các con cô Sharon là do căn bệnh di truyền có tên là Hội chứng Leigh do gene nằm trong ti thể gây ra. Đây là một tình trạng rối loạn thần kinh nghiêm trọng thường xuất hiện trong một năm đầu đời của một đứa trẻ.

- Edward Bernardi nhận gene gây bệnh Leigh từ mẹ.
- Quá trình tổ hợp và phân li ngẫu nhiên của các NST trong quá trình thụ tinh giúp Edward Bernardi có thể sinh những đứa con bình thường.
- Giả sử chồng cô có gene gây bệnh Leigh, cô không mang gene bệnh thì những đứa con của cô sinh ra sẽ có xác suất bị bệnh là 50%.
- Edward Bernardi có thể sinh con khỏe mạnh bình thường bằng phương pháp TPIVF (thụ tinh trong ống nghiệm).

PHẦN III: Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1: Sử dụng đồng vị phóng xạ C^{14} trong CO_2 để tìm hiểu về quá trình quang hợp ở một loài thực vật C_3 . Tiến hành 2 thí nghiệm với 2 chậu cây:



- Thí nghiệm 1: Chiếu sáng và cung cấp CO_2 đầy đủ cho chậu cây. Sau 1 khoảng thời gian thì không chiếu sáng và cung cấp CO_2 có chứa đồng vị phóng xạ C^{14} vào môi trường. Quan sát tín hiệu phóng xạ theo thời gian.

- Thí nghiệm 2: Chiếu sáng và cung cấp CO₂ mang đồng vị phóng xạ C¹⁴. Sau một thời gian thì ngừng cung cấp CO₂ nhưng vẫn chiếu sáng cho chậu cây. Quan sát tín hiệu phóng xạ theo thời gian.


Từ kết quả thu được ở 2 thí nghiệm trên, hãy cho biết có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng?

- (1) Trong thí nghiệm 1, khi tắt ánh sáng thì pha sáng không diễn ra nên không tạo ra ATP và NADPH, quá trình tái tạo RuBP từ PGA bị giảm.
- (2) Trong thí nghiệm 2, khi không có CO₂ nhưng vẫn có ánh sáng, ATP, NADPH vẫn được tạo ra bình thường còn lượng RuBP giảm dần.
- (3) Chất X là APG, chất Y là RuBP.
- (4) Nếu tiến hành thí nghiệm tương tự trên thực vật CAM, trong trường hợp không có CO₂, tín hiệu phóng xạ sẽ xuất hiện chủ yếu trong acid malic.


Câu 2: Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ chứa N¹⁴ (lần thứ 1). Sau ba thế hệ, người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy chỉ chứa N¹⁵ (lần thứ 2) để cho mỗi tế bào nhân đôi 2 lần. Sau đó, lại chuyển các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N¹⁴ (lần thứ 3) để chúng nhân đôi 2 lần nữa. Kết thúc quá trình trên, số tế bào chỉ chứa N¹⁴ là bao nhiêu?

Câu 3. Giả sử một Operon có các trình tự nucleotide được kí hiệu Q, R, S, T, U. Hình bên thể hiện các đột biến mất đoạn (đoạn bị mất kí hiệu \ \ \) và hậu quả xảy ra ở các trình tự. Theo lý thuyết, trong các nhận định sau, có mấy nhận định **không** đúng?

- (1) Vùng S và T là vùng có liên quan đến các gene điều hòa và vùng vận hành O.
- (2) Vùng Q có thể liên quan đến vùng vận hành.
- (3) Đoạn U là vùng liên quan tới gene cấu trúc.
- (4) Đoạn R, U liên quan đến gene điều hòa.




Câu 4. Sơ đồ phả hệ sau mô tả sự di truyền của hai bệnh:




Mỗi bệnh do 1 trong 2 allele của 1 gene quy định, người số 10 không mang allele gây bệnh A, người số 8 không mang allele gây bệnh B, các gene phân li độc lập. Cặp vợ chồng số (12) – (13) sinh con, xác suất để người con này là con trai và không mang allele gây bệnh là bao nhiêu phần trăm?

Câu 5. Tính trạng thân xám (A), cánh dài (B) ở ruồi giấm là trội hoàn toàn so với thân đen (a), cánh cụt (b); 2 gen quy định tính trạng cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Gen D quy định mắt màu đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt màu trắng nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Thế hệ P cho giao phối ruồi cái $\frac{AB}{ab}X^DX^d$ với ruồi đực $\frac{AB}{ab}X^dY$ được F₁ có 180 cá thể, trong đó có 9 ruồi cái đen, cụt, trắng. Cho rằng tất cả các trứng tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh và hiệu suất thụ tinh của trứng là 80% và 100% trứng thụ tinh được phát triển thành cá thể. Theo lý thuyết, có bao nhiêu tế bào trứng không xảy ra hoán vị gen?

Câu 6. Khi lai thuận nghịch hai giống lúa đại mạch có lá màu xanh lục bình thường (màu xám) và lục nhạt (màu trắng) với nhau thì thu được kết quả như hình dưới đây.



Lai thuận



Lai nghịch

Nếu lấy hạt phấn của cây được tạo ra từ phép lai thuận thụ phấn cho cây được tạo ở phép lai nghịch thu được đời con có màu xanh lục nhạt (màu trắng) chiếm tỉ lệ bao nhiêu phần trăm?

_____ Hết _____